

Storm® Secure

Cebo en bloque de cera (BB)

Rodenticida profesional

Composición: 0,005% p/p de Floucoumafen
0,001% de Sustancia de sabor amargo
100% Excipientes csp

Inscrito en el Registro de Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública y Consumo con el nº 10-10-03966 y 10-10-03966 HA

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta.

Uso ambiental exclusivo por personal especializado

Nº de lote y fecha de fabricación por razones técnicas en otro lugar del envase.

Bajo condiciones normales y controladas de almacenamiento este producto tiene una vida media de 5 años desde la fecha de producción.

Contenido neto: **10 kg**
P.V.P.

® = Marca registrada de BASF

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Storm Secure es un rodenticida anticoagulante eficaz contra gran variedad de especies de roedores. **Storm Secure** interfiere los mecanismos de coagulación de la sangre produciendo hemorragias internas generalizadas. **Storm Secure** produce la muerte de ratas y ratones después de una sola alimentación, aunque la muerte ocurre al cabo de unos días. **Storm Secure** está listo para ser usado y no se ha de diluir, ni mezclar.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Uso ambiental y en la industria alimentaria para el control de roedores en locales y edificios.

MODO DE EMPLEO

En portacebos correctamente etiquetados.

En edificios, locales, almacenes y recintos, contra ratas y ratones:

- Antes de colocar el cebo, determinar la localización de todas las entradas y madrigueras y zonas de alimentación, con objeto de realizar adecuadamente los puntos de cebo. Eliminar, inmediatamente, cualquier bloque encontrado fuera de los puntos de cebado.

- **Ratas:** Colocar dos o tres bloques por punto de cebo. Los puntos de cebo más adecuados son las entradas de las madrigueras, los corredores y los lugares cercanos al tránsito habitual de las ratas. Intentar establecer una barrera de cebos entre las áreas de alimentación y las áreas de habitación. Los puntos de cebo pueden estar tan cerca como a distancias de 5 metros en infestaciones fuertes y de 10 m en infestaciones más ligeras. Examinar los puntos de cebo al cabo de 3 días y reponer cuando haya sido comidos, repetir la inspección a intervalos de 7 días, hasta terminar la plaga. Normalmente sólo se requieren 3 ó 4 inspecciones para determinar a los roedores. Asegurar los bloques, aprovechando su forma, dentro de los portacebos correctamente etiquetados.

Si se encontrara cualquier signo de fragmento de bloque lejos del punto de cebo recogerlo y gestionarlo adecuadamente su eliminación.

- **Ratones:** Los ratones presentan mayor dificultad en su control, siendo muy importante la inspección previa del lugar de tratamiento. Disponer bloques simples de Storm Secure hasta con 2 metros de separación en zonas donde la actividad de los ratones sea evidente. Serán puntos adecuados de cebo: los agujeros, corredores, detrás y debajo del mobiliario y particularmente donde se agitan los alimentos.

Inspeccionar los puntos de cebo y reemplazar los bloques en la misma forma que para las ratas.

En las cloacas:

La forma de Storm Secure, permite la colocación de varios bloques, hasta seis si fuera necesario por punto de cebo, ensartándolos o colgándolos de forma que no estén en contacto con las zonas húmedas. Inspeccionar los bloques y reponer cuando sea necesario.

PRECAUCIONES

No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos.

Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que el producto contamine los utensilios, los alimentos y sus envases.

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en el interior de los recintos donde sean inaccesibles a los niños y a otros animales no objetivo del tratamiento.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Xn



Nocivo

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- Usense guantes adecuados.
- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela etiqueta).

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrela etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

La intoxicación puede producir

Diétesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina-tiempo prolongado de la protrombina- que puede hacerse evidente en un plazo mínimo de 24 horas y máximo de 72 horas (Un tiempo de protrombina normal al ingreso, no excluye el diagnóstico).

Primeros auxilios

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.

- En caso de ingestión **NO** provoque el vómito.

- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario

- Si no han transcurrido dos horas desde la ingesta, realizar vaciado gástrico, administrando a continuación una dosis de carbón activado (25 g).
- Antídoto: Vitamina K1 (Konakion).
- Controlar el tiempo de protrombina o INR.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.